

โรคตาแดง

โรคตาแดงเป็นโรคตาที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ คือจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และภูมิแพ้ ทั้ง 3 สาเหตุ ทำให้เกิดอาการตาแดงได้คล้ายคลึงกัน แต่มีลักษณะของย่างที่แตกต่างกันจึงควรวินิจฉัยแยกโรค เพื่อให้การรักษาและการดูแลคนของอย่างถูกต้องและเหมาะสม

โรคตาแดงจากภูมิแพ้(Allergic Conjunctivitis)

เป็นการอักเสบของเยื่อบุตาที่เกิดจากการแพ้ เช่นแพ้เกสรดอกไม้ ฝุ่น ยา ควันบุหรี่ เป็นต้น มักจะเป็นๆ หายๆ และเป็นร่วมกับโรคภูมิแพ้อย่างอวบะวะอื่น เช่น น้ำมูกไหล หืด หรือผื่นแพ้ที่ผิวนัง เมื่อเป็นติดต่อกันนานๆ จะทำให้เป็นตื้อลมและตื้อนেืือได้

อาการสำคัญคือ คันตามากโดยเฉพาะตรงบริเวณหัวตา, ตาแดงเรื่อๆ มักจะเป็นสองข้าง, ระคายเคืองตา, ตาบวม, มีน้ำตาไหล, มีเมือกหรือขี้ตาใสๆ

การป้องกันและรักษาคือ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้, ประคบเย็น เพื่อลดอาการบวม, ใช้ยาหยดตาแก้แพ้ ยาหยดตาลดการอักเสบ และยาแก้แพ้ชนิดรับประทาน

*** ตาแดงชนิดนี้ไม่ทำให้เกิดการติดต่อ ถ้าไม่มีการติดเชื้อร่วมด้วย

โรคตาแดงจากเชื้อแบคทีเรีย(Bacterial Conjunctivitis)

เป็นการอักเสบของเยื่อบุตาที่เกิดจากการติดเชื้อ S.epidermidis, S.aureus

อาการสำคัญคือ มีอาการตาแดง ไม่มาก มีขี้ตามากสีเขียวปนเหลือง ทำให้เปิดตาลำบากในตอนเช้า มักจะไม่มีอาการปวดตาหรือเคืองตา ไม่มีอาการคัน อาจเป็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ บางรายมีไข้ร่วมด้วย

การรักษาคือ ใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเช็ดทำความสะอาดเปลือกตา เพื่อให้ขี้ตาอ่อนตัวลง, ใช้ยาหยดตาปฏิชีวนะและอาจใช้ยาหยดตาแก้แพ้ร่วมด้วย

โรคตาแดงจากเชื้อไวรัส(Viral Conjunctivitis)

เป็นการอักเสบของเยื่อบุตาจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม adenovirus พบน้อยในเด็กเล็กๆ มีกระบวนการคุกคุมและแพร่กระจายได้ง่ายตามชุมชน โรงเรียน ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยแล้ว ก็อาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้

อาการสำคัญคือ เยื่อบุตาขาวจะอักเสบแดงมาก ปวดตา เคืองตา มีน้ำตาไหล กลัวแสง ตื่มน้ำเหลือง หลงหมาดเจ็บและบวม มักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วคิดต่อมาบังคับอีกข้าง

การรักษา จะรักษาตามอาการของโรค เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสซึ่งไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส แต่สามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ถ้ามีไข้ เจ็บคอ ให้ใช้ยาแก้อักเสบร่วมกับยาลดไข้ ยาลดปวด แต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์

โรคตาแดงติดต่อ กันได้อย่างไร ?

โรคตาแดงมีกระบวนการในกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันอย่างแออัด โดยส่วนใหญ่จะติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสถูกน้ำตา ขี้ตา ของผู้ป่วยหรือคุกคุมกับผู้ป่วยโดยตรง หรืออาจติดต่อทางอ้อมได้โดย

- ใช้มือสักปักที่มีเชื้อโรคขี้ตา



- ใช้สิ่งของเครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แหวนตา เครื่องสำอางค์ และของใช้อื่นๆ ร่วมกับผู้ที่เป็นโรค

- แมลงวันหรือแมลงหิ่มตอมตา



** ทั้งนี้ โรคตาแดง จะไม่ติดต่อทางการสบสายตา ทางอากาศ หรือรับประทานอาหารร่วมกัน และอาการต่างๆ จะเกิดได้ภายใน 1-2 วัน และระยะเวลาติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ 14 วัน

เมื่อเป็นโรคตาแดงควรปฏิบัติตัวอย่างไร ?

- ควรหยุดเรียนหรือหยุดงานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือจนกว่าอาการตาแดงจะหายเป็นปกติ และไม่ควรไปอยู่ในที่ชุมชน เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า หรือลงเล่นน้ำในทะเล เพราะอาจนำโรคไปแพร่ติดต่อสู่ผู้อื่นได้